



**Modulo di richiesta  
dell'albumina umana**

Codice: MODFARM02

Data: 15 febbraio 2016

Revisione: 1

Data \_\_\_\_\_ Reparto \_\_\_\_\_

Paziente \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Albuminemia (g/dl) \_\_\_\_\_ (<2,5 g/dl) Protidemia totale (g/dl) \_\_\_\_\_ In data: \_\_\_\_\_

Disponibili in Farmacia: CRISTALLOIDI → Ringer lattato (prima scelta), fisiologica, glucosata 5% COLLOIDI SINTETICI → Poligelina (Infuplas), Idrossietilamido (Amidolite)

**USO INAPPROPRIATO DI ALBUMINA**

- Albuminemia > 2,5 g/dl
- Malnutrizione, malassorbimento
- Cicatrizzazione delle ferite
- Ipoalbuminemia cronica in assenza di edemi e/o ipotensione acuta
- Ischemia cerebrale (unica scelta: cristalloidi)
- Dialisi (prima scelta: cristalloidi)
- Mobilizzazione ascite

**INDICAZIONI ALL'USO DELL'ALBUMINA**

**PATOLOGIE ACUTE**

<input type="checkbox"/>	Paracentesi	4 g di albumina /litro di liquido ascitico estratto, dopo paracentesi di volumi superiori ai 4 litri, in unica soluzione al termine della paracentesi. Se il volume di liquido ascitico è minore, i cristalloidi sono la scelta corretta
<input type="checkbox"/>	Ittero neonatale grave	Albumina non contemporaneamente a fototerapia e non prima della trasfusione di scambio
<input type="checkbox"/>	Plasmaferesi	Albumina per scambio > 20 ml/Kg in una seduta o > 20 ml/Kg/sett. in sedute successive
<input type="checkbox"/>	Interventi di chirurgia maggiore	1. scelta: soluzioni di cristalloidi; 2. scelta: soluzioni di colloidii sintetici; Uso albumina: quando i colloidii sintetici sono controindicati o se albuminemia < 2 g/dl dopo la normalizzazione della volemia,
<input type="checkbox"/>	ARDS Sindrome da insufficienza respiratoria nell'adulto	Albumina solo dopo normalizzazione della permeabilità dei capillari polmonari (uso profilattico può essere pericoloso).
<input type="checkbox"/>	Shock emorragico	1. scelta: soluzioni di cristalloidi; 2. scelta: soluzioni di colloidii sintetici. L'Albumina, in genere controindicata, può essere usata solo: <ul style="list-style-type: none"><li>• se necessaria una restrizione di sodio (albumina 20% diluita al 5% con glucosata al 5%)</li><li>• se documentata sensibilizzazione ai colloidii sintetici.</li></ul>
<input type="checkbox"/>	Shock non emorragico (da alterazioni della distribuzione – Anasarca)	1. scelta: soluzioni di cristalloidi; 2. scelta: colloidii sintetici in caso di edema polmonare e/o periferico ed in assenza di risposta dopo infusione di almeno 2 litri di cristalloidi. Albumina solo se documentata sensibilizzazione ai colloidii sintetici.
<input type="checkbox"/>	Ustioni	1. scelta: soluzioni di cristalloidi; 2. scelta: associazioni di colloidii sintetici e cristalloidi solo se coesistono le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le ustioni interessano più del 50% della superficie corporea;</li><li>▪ Sono trascorse più di 24 ore dal momento in cui sono avvenute le ustioni;</li><li>▪ Il trattamento con cristalloidi non ha corretto l'ipovolemia.</li></ul> Albumina solo se documentata sensibilizzazione ai colloidii sintetici.

**PATOLOGIE CRONICHE**

<input type="checkbox"/>	Sindrome nefrosica grave	Albumina solo nei pazienti resistenti ai diuretici con albuminemia < 2g/dl con ipovolemia e/o edema polmonare e/o insufficienza renale acuta.
<input type="checkbox"/>	Cirrosi epatica avanzata	In pazienti con albuminemia < 2g /dl, se non responsivi alla terapia diuretica: somministrazione intraospedaliera di 10 g/die di albumina eventualmente seguita da 20 g/sett in terapia domiciliare.
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

SI RICHIEDONO N. \_\_\_\_\_ FLACONI DI ALBUMINA 20% 50 ML

DOSE GIORNALIERA \_\_\_\_\_ DURATA PREVISTA TERAPIA \_\_\_\_\_

MEDICO RICHIEDENTE (firma leggibile)

**SPAZIO RISERVATO ALLA FARMACIA**

Richiesta pervenuta il \_\_\_\_\_ Consegnati n° \_\_\_\_\_ flaconi Lotto n° \_\_\_\_\_

Valutazione del R.A.Q. \_\_\_\_\_ Firma del R.A.Q. \_\_\_\_\_