

	PREPARAZIONE AL POSIZIONAMENTO PEG	Codice: MODGel04 Data: 01/09/2025 Revisione: 1 Pagina 1 di 1
---	---	---

S.C. GASTROENTEROLOGIA – ENDOSCOPIA DIGESTIVA

P.O. "Michele e Pietro Ferrero" Via Tanaro, 7/9 – 12060 Verduno CN

gastroenterologia@alscn2.it – Tel.0172 1408627 – 0172 1408118

Direttore M. A. La Terra

Coordinatore G.Tonti

Staff Medico Tel. 0172 1408116

Staff Infermieristico Tel. 0172 1408117

PREPARAZIONE AL POSIZIONAMENTO DELLA PEG

- Esami ematochimici di routine: emocromo, coagulazione.
- Segnalazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima rispetto alla data fissata per la procedura) della eventuale assunzione di **TERAPIA ANTICOAGULANTE** (es: Coumadin, Sintrom, Nuovi anticoagulanti orali) o di antiaggreganti (aspirina, clopidogrel, ticlopidina, ticagrelor) in modo da poter attuare per tempo l'eventuale sospensione o modifica della terapia secondo le indicazioni mediche
- **È NECESSARIO IL DIGIUNO DA CIBI, MISCELE NUTRIZIONALI** nelle **8 ore** precedenti poiché è fondamentale che lo stomaco sia vuoto per la visione ottimale del viscere e per evitare problematiche anestesiologiche. È possibile assumere sino a 4 ore prima dell'intervento liquidi chiari in modica quantità.
- Rasatura dei peli dell'addome (tricotomia)
- Rimozione di protesi dentarie
- Posizionamento di ago-cannula in una vena periferica
- Corretta igiene del cavo orale
- Circa 30 min prima della procedura de somministrata una profilassi antibiotica con Amoxicillina/Ac. Clavulanato 2.2 gr; in caso di allergia Ciprofloxacina 500 mg, al fine di prevenire l'infezione della parete addominale nel punto di inserzione della PEG.