

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER PRESCRIZIONE DI BUCCOLAM

Centro prescrittore _____
Medico prescrittore (nome e cognome) _____
Tel. _____ e-mail _____

Paziente (nome e cognome) _____
Data di nascita _____ sesso M F Codice fiscale _____
Residente a _____ Regione _____
ASL di residenza _____ Prov. _____
Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta _____

*Il farmaco può essere prescritto da medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Neurologia e
Pediatría*

**La prescrizione di Buccolam è a carico del SSN solo se rispondente ad una delle seguenti
condizioni:**

- 1) **Trattamento acuto delle crisi nelle epilessie dell'età pediatrica con elevato rischio di
occorrenza di crisi prolungate o di stato di male epilettico**
- **Forme idiopatiche**
 - **Sindrome di Dravet**
 - **Sindrome di Panayiotopoulos**

 - **Trattamento acuto delle crisi nelle altre epilessie dell'età pediatrica, dopo un precedente
episodio di crisi prolungata o di stato di male epilettico**
 - **Forme idiopatiche**
 - **Forme sintomatiche a varia eziologia**

Si raccomanda la presa visione ed osservanza della nota limitativa AIFA n°

Piano terapeutico valido 12 mesi **Prima prescrizione** **Prosecuzione della cura**

Età del bambino _____

Dose prescritta in caso di crisi epilettica in atto: **Età da 6 mesi a 1 anno: 2,5 mg**

Età da 1 a 5 anni: 5 mg

Età da 5 a 10 anni: 7,5 mg

Età da 10 a 18 anni: 10 mg

Data ___/___/___

Timbro e firma del medico specialista prescrittore



Bibliografia

1. Capovilla G, Beccaria F, Minicucci F, Sartori S, Vecchi M and Beghi E. Treatment of convulsive status epilepticus in childhood: recommendations of the Italian League Against Epilepsy (LICE). *Epilepsia*, in press.
2. Capovilla G, Vecchi M, Beccaria F, Sartori S, Minicucci F, Vigeveno F. Trattamento dello stato epilettico convulsivo del bambino: raccomandazioni della Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE). 2012; http://www.lice.it/pdf/sec_pediatico.pdf
3. Capovilla G, Striano S and Beccaria F. Changes in Panayiotopoulos syndrome over time. *Epilepsia* 2009; 50, suppl 5: 45-8.
4. Dravet C. The core Dravet syndrome phenotype. *Epilepsia* 2011, suppl 2; 3-9.
5. McIntyre J, Robertson S, Norris E et al. Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial. *Lancet* 2005; 366: 205-210.
6. Mpimbaza A, Ndezi G, Staedke S, Rosenthal PJ, Byarugaba J. Comparison of buccal midazolam with rectal diazepam in the treatment of prolonged seizures in Ugandan children: a randomized clinical trial. *Pediatrics* 2008; 121: e58-64.
7. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. NHS Evidence, 2012.
8. Scott RC, Besag FM, Neville BG. Buccal midazolam and rectal diazepam for treatment of prolonged seizures in childhood and adolescence: a randomised trial. *Lancet* 1999; 353: 623-626.
9. Specchio N, Trivisano M, Di Ciompo V, Cappelletti S, Masciarelli G, Volkov J, Fusco L and Vigeveno F. Panayiotopoulos syndrome: A clinical, EEG and neuropsychological study of 93 consecutive patients. *Epilepsia* 2011; 51: 2098-2107.

13A03571

