

**ALLEGATO 32:** Informativa sulla procedura di posizionamento di Midline

### INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DI POSIZIONAMENTO MIDLINE

**Persona assistita:** .....

**Nato/a a**.....**il**.....

**Rappresentante Legale:** .....

**Genitori: Padre** .....

**Madre** .....

**Medico richiedente**.....

**Finalità:** il posizionamento di un **Catetere Venoso Periferico – Midline**, assicura un accesso venoso affidabile a medio termine che consente la somministrazione delle terapie necessarie compatibili con l'infusione in vena periferica e l'esecuzione di prelievi ematici.

La **tecnica di posizionamento**, espletata da operatori esperti, consiste nel pungere, in anestesia locale, con tecnica eco guidata, una vena del braccio ed inserire un catetere facendolo avanzare per circa 25 cm fino alla vena ascellare o succlavia.

La procedura prevede un tempo medio di 20 minuti.

Come tutte le pratiche medico-chirurgiche, questa procedura, anche se attuata con perizia, diligenza e prudenza, presenta un certo numero di **complicanze o effetti collaterali**, che, sebbene non frequenti, si potrebbero verificare immediatamente (difficoltà o impossibilità ad incannulare la vena, ematoma locale, puntura di un nervo o di un'arteria, sindrome vaso – vagale, reazioni allergiche, altre più rare) ed altre durante l'utilizzo nel tempo del dispositivo stesso (infezione locale e generale, flebite, tromboflebite, malfunzionamento con conseguente necessità di sostituzione, occlusione del catetere, altre più rare).

Nell'eventualità che si manifestassero, tali complicanze verrebbero trattate tempestivamente.

Si informa che in questo ospedale sono disponibili tutti gli strumenti per affrontarle.

La medicazione del CVP verrà effettuata da personale infermieristico secondo la procedura aziendale al fine di ridurre il rischio di sviluppo di infezione cutanea o sistemica.

**Data avvenuta informazione al paziente:** .....