

## 10.2.20 ALLEGATO 20

### INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DI POSIZIONAMENTO PICC/MIDLINE

#### PICC: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

**Finalità:** il posizionamento di un **Catetere Venoso Centrale ad inserzione periferica**, denominato PICC, assicura un accesso venoso centrale a medio termine affidabile che consente la somministrazione delle terapie necessarie e l'esecuzione di prelievi ematici.

La **tecnica di posizionamento** consiste nel pungere, in anestesia locale, con tecnica ecoguidata, da parte di operatori esperti, una vena del braccio, introdurre un catetere e farlo avanzare fino alla vena cava superiore. Durante la procedura, che dura circa 30 minuti, il corretto posizionamento del catetere viene valutato attraverso diverse metodiche a disposizione (ECG intracavitario, sistema di navigazione, controllo radiologico). Come tutte le pratiche medico-chirurgiche, questa procedura, anche se attuata con perizia, diligenza e prudenza, presenta un certo numero di **complicanze o effetti collaterali**, che, sebbene non frequenti, si potrebbero verificare immediatamente (difficoltà o impossibilità ad incannulare la vena, aritmie, ematoma locale, puntura di un nervo o di un'arteria, sindrome vaso – vagale, reazioni allergiche, altre più rare) ed altre durante l'utilizzo nel tempo del dispositivo stesso (infezione locale e generale, flebite, tromboflebite, malfunzionamento con conseguente necessità di sostituzione, occlusione del catetere, altre più rare). Nell'eventualità che si manifestassero, tali complicanze verrebbero trattate tempestivamente.

Si informa che in questo ospedale sono disponibili tutti gli strumenti per affrontarle.

La procedura può comportare l'impiego di Raggi X, con rischi potenziali nel caso di donne in età fertile nel sospetto di/o in gravidanza e l'utilizzo di un mezzo di contrasto, farmaco che può raramente provocare reazioni allergiche del tutto imprevedibili e classificate in lievi (nausea, vomito, prurito), moderate (vomito profuso, orticaria diffusa, edema facciale, broncospasmo) e severe (shock allergico, edema polmonare, arresto cardiocircolatorio). Si informa che in questo ospedale sono disponibili tutti gli strumenti per affrontarle.

La medicazione del CVC verrà effettuata da personale infermieristico, secondo la procedura aziendale al fine di ridurre il rischio di sviluppo di infezione cutanea o sistemica.

#### DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE

Io sottoscritto/a ..... dichiaro di:

ESSERE PIENAMENTE COSCIENTE

AVER RICEVUTO in data ..... dal/dalla Dr/Dr.ssa .....

in modo chiaro ed esaustivo le informazioni inerenti la necessità del posizionamento del Catetere Venoso PICC in particolare su benefici, eventuali rischi, effetti collaterali, complicanze;

AVER LETTO ATTENTAMENTE questo documento e AVERNE COMPRESO tutto il contenuto.

Data ..... Ora ..... Firma paziente .....

Firma tutore/ Amministratore di sostegno .....

Firma genitori (o affidatari): padre .....

madre .....

## INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DI POSIZIONAMENTO PICC/MIDLINE

### MIDLINE: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

**Finalità:** il posizionamento di un **Catetere Venoso Periferico – Midline**, assicura un accesso venoso affidabile a medio termine che consente la somministrazione delle terapie necessarie compatibili con l'infusione in vena periferica e l'esecuzione di prelievi ematici.

La **tecnica di posizionamento**, espletata da operatori esperti, consiste nel pungere, in anestesia locale, con tecnica eco guidata, una vena del braccio ed inserire un catetere facendolo avanzare per circa 25 cm fino alla vena ascellare o succlavia.

La procedura prevede un tempo medio di 20 minuti.

Come tutte le pratiche medico-chirurgiche, questa procedura, anche se attuata con perizia, diligenza e prudenza, presenta un certo numero di **complicanze o effetti collaterali**, che, sebbene non frequenti, si potrebbero verificare immediatamente (difficoltà o impossibilità ad incannulare la vena, ematoma locale, puntura di un nervo o di un'arteria, sindrome vaso – vagale, reazioni allergiche, altre più rare) ed altre durante l'utilizzo nel tempo del dispositivo stesso (infezione locale e generale, flebite, tromboflebite, malfunzionamento con conseguente necessità di sostituzione, occlusione del catetere, altre più rare).

Nell'eventualità che si manifestassero, tali complicanze verrebbero trattate tempestivamente.

Si informa che in questo ospedale sono disponibili tutti gli strumenti per affrontarle.

La medicazione del CVP verrà effettuata da personale infermieristico secondo la procedura aziendale al fine di ridurre il rischio di sviluppo di infezione cutanea o sistemica.

### DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE

Io sottoscritto/a ..... dichiaro di:

ESSERE PIENAMENTE COSCIENTE

AVER RICEVUTO in data ..... dal/dalla Dr/Dr.ssa .....

in modo chiaro ed esaustivo le informazioni inerenti la necessità del posizionamento del Catetere Venoso Periferico Midline in particolare su benefici, eventuali rischi, effetti collaterali, complicanze;

AVER LETTO ATTENTAMENTE questo documento e AVERNE COMPRESO tutto il contenuto.

Data ..... Ora ..... Firma paziente .....

Firma tutore/ Amministratore di sostegno .....

Firma genitori (o affidatari): padre .....

madre .....