

# FLUOROCHINOLONI – LIMITAZIONI D'USO

I fluorochinoloni ad uso sistemico e inalatorio NON devono essere prescritti per:

- ❑ i pazienti che abbiano avuto in precedenza delle reazioni avverse gravi con un antibiotico chinolonico o fluorochinolonic;
- ❑ le infezioni non gravi o autolimitanti (come faringiti, tonsilliti e bronchiti acute);
- ❑ le infezioni da lievi a moderate (incluse cistite non complicata, esacerbazione acuta di bronchite cronica e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), rinosinusite batterica acuta e otite media acuta) a meno che gli altri antibiotici comunemente raccomandati per queste infezioni siano ritenuti inappropriati;
- ❑ le infezioni non batteriche, ad es. prostatite non batterica (cronica);
- ❑ prevenire la diarrea del viaggiatore o le infezioni ricorrenti del tratto urinario inferiore.

Tra le reazioni avverse gravi: tendinite, rottura del tendine, artralgia, dolore alle estremità, disturbi della deambulazione, neuropatie associate a parestesia, depressione, stanchezza, compromissione della memoria, allucinazioni, psicosi, disturbi del sonno e disturbi dell'udito, della vista, del gusto e dell'olfatto.