


Schede per patologia





Popolazione piemontese 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni	1.007.353	969.096	1.976.449
46-60 anni	519.240	529.468	1.048.708
61-75 anni	387.088	424.323	811.411
76-85 anni	167.516	223.467	390.983
86+ anni	51.150	107.121	158.271



Tumore del colon-retto



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza del tumore del colon risulta del 5,24/1.000, leggermente maggiore per le persone di sesso maschile (5,57) rispetto a quelle di sesso femminile (4,94).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 76 e gli 85 anni, con una prevalenza pari al 17,46/1.000, in particolare 14,81 per le persone di sesso femminile e 21,00 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 l'incidenza media risulta pari allo 0,93/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso maschile (1,01).

TREND. Si nota un incremento dell'incidenza tra il 2017 e il 2018, mentre vi è una leggera decrescita tra il 2018 e il 2019, rilevabile anche se si considerano separatamente i due sessi.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	115	99	214
n. casi /1.000	0,11	0,10	0,10
46-60 anni			
n. casi	375	316	690
n. casi /1.000	0,72	0,59	0,66
61-75 anni			
n. casi	838	673	1.511
n. casi /1.000	2,14	1,58	1,84
76-85 anni			
n. casi	715	610	1.325
n. casi /1.000	3,99	2,60	3,20
86+ anni			
n. casi	194	275	468
n. casi /1.000	3,19	2,17	2,50
Tutte le età			
n. casi	2.236	1.972	4.208
n. casi /1.000	1,01	0,85	0,93

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	653	616	1.269
n. casi /1.000	0,65	0,64	0,64
46-60 anni			
n. casi	1.929	1.706	3.635
n. casi /1.000	3,72	3,22	3,47
61-75 anni			
n. casi	4.803	4.107	8.910
n. casi /1.000	12,41	9,68	10,98
76-85 anni			
n. casi	3.518	3.310	6.828
n. casi /1.000	21,00	14,81	17,46
86+ anni			
n. casi	967	1.384	2.351
n. casi /1.000	18,91	12,92	14,85
Tutte le età			
n. casi	11.870	11.123	22.993
n. casi /1.000	5,57	4,94	5,24

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 153 Procedure (negli ultimi 6 anni): 4571-4576, 4579, 458
FARMACI	
ESENZIONI	
ALTRO	



Tumore del polmone



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza del tumore del polmone risulta dell'1,54/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (1,99) rispetto a quelle di sesso femminile (1,11).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 76 e gli 85 anni, con una prevalenza pari al 4,40/1.000, in particolare 2,77 per le persone di sesso femminile e 6,57 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 l'incidenza media risulta pari allo 0,56/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso maschile (0,78).

TREND. L'incidenza sulla popolazione rimane sostanzialmente stabile nei tre anni.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	79	34	113
n. casi /1.000	0,08	0,03	0,06
46-60 anni			
n. casi	218	147	365
n. casi /1.000	0,42	0,28	0,35
61-75 anni			
n. casi	790	371	1.161
n. casi /1.000	2,01	0,87	1,42
76-85 anni			
n. casi	512	221	733
n. casi /1.000	2,86	0,94	1,77
86+ anni			
n. casi	110	53	163
n. casi /1.000	1,81	0,42	0,87
Tutte le età			
n. casi	1.709	827	2.536
n. casi /1.000	0,78	0,36	0,56

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	489	189	678
n. casi /1.000	0,49	0,20	0,34
46-60 anni			
n. casi	592	499	1.091
n. casi /1.000	1,14	0,94	1,04
61-75 anni			
n. casi	1.954	1.120	3.074
n. casi /1.000	5,05	2,64	3,79
76-85 anni			
n. casi	1.100	619	1.719
n. casi /1.000	6,57	2,77	4,40
86+ anni			
n. casi	100	75	175
n. casi /1.000	1,96	0,70	1,11
Tutte le età			
n. casi	4.235	2.502	6.737
n. casi /1.000	1,99	1,11	1,54

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Diagnosi principale (negli ultimi 6 anni): 162 Oppure Nelle diagnosi secondarie " 162 " + diagnosi principale (negli ultimi 6 anni): V581, V5811, V671, V672 Oppure Nelle diagnosi secondarie " 162 " + procedura principale (negli ultimi 6 anni): 9925, 9928 Oppure Procedure (negli ultimi 6 anni): 3201, 3209, 3222, 3228, 3229, 321, 323-326, 329
FARMACI	
ESENZIONI	
ALTRO	



Tumore della mammella



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza del tumore della mammella per le persone di sesso femminile risulta del 21,26/1.000.
CLASSE DI ETÀ. La classe di età più affetta è quella tra i 61 e i 75 anni, con una prevalenza pari al 35,56/1.000.
INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 l'incidenza media risulta pari al 2,66/1.000.
TREND. L'incidenza sulla popolazione rimane sostanzialmente stabile nei tre anni.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi		1.040	
n. casi /1.000		1,04	
46-60 anni			
n. casi		2.040	
n. casi /1.000		3,84	
61-75 anni			
n. casi		1.900	
n. casi /1.000		4,45	
76-85 anni			
n. casi		956	
n. casi /1.000		4,07	
86+ anni			
n. casi		250	
n. casi /1.000		1,98	
Tutte le età			
n. casi		6.186	
n. casi /1.000		2,66	

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi		6.334	
n. casi /1.000		6,54	
46-60 anni			
n. casi		16.762	
n. casi /1.000		31,66	
61-75 anni			
n. casi		15.089	
n. casi /1.000		35,56	
76-85 anni			
n. casi		7.589	
n. casi /1.000		33,96	
86+ anni			
n. casi		2.140	
n. casi /1.000		19,98	
Tutte le età			
n. casi		47.914	
n. casi /1.000		21,26	

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 174, 2330 Procedure (negli ultimi 6 anni): 8512, 8520, 8521, 8522, 8523, 8525, 8533, 8534, 8535, 8536, 8541-8548
FARMACI	
ESENZIONI	
ALTRO	



Iperplasia prostatica



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di iperplasia prostatica per le persone di sesso maschile risulta del 93,74/1.000.

CLASSE DI ETÀ. La classe di età più affetta è quella tra i 76 e gli 85 anni, con una prevalenza pari al 418,19/1.000.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 9,35/1.000.

TREND. Si nota una leggera decrescita dell'1,3% dell'incidenza tra il 2017 e il 2018, e una crescita del 2,7% tra il 2018 e il 2019.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	270		
n. casi /1.000	0,26		
46-60 anni			
n. casi	3.667		
n. casi /1.000	7,02		
61-75 anni			
n. casi	10.300		
n. casi /1.000	26,27		
76-85 anni			
n. casi	5.105		
n. casi /1.000	28,49		
86+ anni			
n. casi	1.267		
n. casi /1.000	20,87		
Tutte le età			
n. casi	20.609		
n. casi /1.000	9,35		

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.211		
n. casi /1.000	1,20		
46-60 anni			
n. casi	18.055		
n. casi /1.000	34,77		
61-75 anni			
n. casi	89.758		
n. casi /1.000	231,88		
76-85 anni			
n. casi	70.053		
n. casi /1.000	418,19		
86+ anni			
n. casi	20.813		
n. casi /1.000	406,90		
Tutte le età			
n. casi	199.890		
n. casi /1.000	93,74		

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 600
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 3 prescrizioni in date differenti: G04CA, G04CB
ESENZIONI	
ALTRO	



Ipotiroidismo



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di ipotiroidismo risulta del 53,20/1.000, molto maggiore per le persone di sesso femminile (87,60) rispetto a quelle di sesso maschile (16,84).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età più affetta è quella tra i 76 e gli 85 anni, con una prevalenza pari a 102,48/1.000, in particolare 146,63 per le persone di sesso femminile e 43,59 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 3,56/1.000, maggiore nelle persone di sesso femminile (5,54) rispetto alle persone di sesso maschile (1,47).

TREND. Si nota una leggera decrescita dell'incidenza tra il 2017 e il 2018 e un incremento del 5,2% tra il 2018 e il 2019, più marcato per le persone di sesso maschile (10,7%) che per quelle di sesso femminile (3,9%).


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	640	4.139	4.779
n. casi /1.000	0,61	4,12	2,33
46-60 anni			
n. casi	780	3.776	4.556
n. casi /1.000	1,49	7,11	4,33
61-75 anni			
n. casi	1.039	2.996	4.035
n. casi /1.000	2,65	7,02	4,93
76-85 anni			
n. casi	598	1.416	2.013
n. casi /1.000	3,34	6,02	4,86
86+ anni			
n. casi	173	554	727
n. casi /1.000	2,84	4,38	3,88
Tutte le età			
n. casi	3.229	12.880	16.110
n. casi /1.000	1,47	5,54	3,56

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	5.491	35.296	40.787
n. casi /1.000	5,45	36,42	20,64
46-60 anni			
n. casi	8.657	54.878	63.535
n. casi /1.000	16,67	103,65	60,58
61-75 anni			
n. casi	12.626	63.218	75.844
n. casi /1.000	32,62	148,99	93,47
76-85 anni			
n. casi	7.302	32.767	40.069
n. casi /1.000	43,59	146,63	102,48
86+ anni			
n. casi	1.823	11.246	13.069
n. casi /1.000	35,64	104,98	82,57
Tutte le età			
n. casi	35.899	197.405	233.304
n. casi /1.000	16,84	87,60	53,20

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 243, 244
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 2 prescrizioni in date differenti: H03A
ESENZIONI	027
ALTRO	



Ipertiroidismo



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di ipertiroidismo risulta del 9,81/1.000, maggiore per le persone di sesso femminile (14,48) rispetto a quelle di sesso maschile (4,87).

CLASSE DI ETÀ. Le classi di età che risultano più affette sono quelle tra i 76 e gli 85 anni e quella degli over 85 anni (con prevalenza pari al 21,02/1.000 e 21,03/1.000 rispettivamente). In entrambi i casi la prevalenza è superiore per le persone di sesso femminile rispetto a quelle di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari allo 0,55/1.000, superiore nelle persone di sesso femminile (0,76/1.000).

TREND. Si nota un trend di crescita dell'incidenza tra il 2017 e il 2018, mentre rimane stabile tra il 2018 e il 2019 assumendo comunque sempre valori molto bassi.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	113	452	565
n. casi /1.000	0,11	0,45	0,28
46-60 anni			
n. casi	177	532	708
n. casi /1.000	0,34	1,00	0,67
61-75 anni			
n. casi	243	398	641
n. casi /1.000	0,62	0,93	0,78
76-85 anni			
n. casi	155	266	422
n. casi /1.000	0,87	1,13	1,02
86+ anni			
n. casi	38	124	162
n. casi /1.000	0,62	0,98	0,86
Tutte le età			
n. casi	725	1.772	2.497
n. casi /1.000	0,33	0,76	0,55

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.222	5.044	6.266
n. casi /1.000	1,21	5,20	3,17
46-60 anni			
n. casi	2.360	9.223	11.583
n. casi /1.000	4,55	17,42	11,05
61-75 anni			
n. casi	3.733	9.886	13.619
n. casi /1.000	9,64	23,30	16,78
76-85 anni			
n. casi	2.374	5.843	8.217
n. casi /1.000	14,17	26,15	21,02
86+ anni			
n. casi	704	2.625	3.329
n. casi /1.000	13,76	24,50	21,03
Tutte le età			
n. casi	10.393	32.621	43.014
n. casi /1.000	4,87	14,48	9,81

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 2420, 2421, 2422, 2423
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 2 prescrizioni in date differenti: H03B
ESENZIONI	035
ALTRO	



Diabete mellito



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di diabete mellito risulta del 65,73/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (72,51) rispetto a quelle di sesso femminile (59,31).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella di età compresa tra i 76 e gli 85 anni, con una prevalenza pari a 205.35/1.000, in particolare 181.91/1.000 per le persone di sesso femminile e 236.63/1.000 per le persone di sesso maschile

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 3,89/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso maschile (4,31).

TREND. L'incidenza decresce tra il 2017 e il 2018, mentre aumenta tra il 2018 e il 2019 sia per le persone di sesso maschile che per quelle di sesso femminile.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	824	933	1.757
n. casi /1.000	0,79	0,93	0,86
46-60 anni			
n. casi	2.740	1.740	4.480
n. casi /1.000	5,25	3,28	4,25
61-75 anni			
n. casi	4.021	3.016	7.037
n. casi /1.000	10,25	7,06	8,59
76-85 anni			
n. casi	1.561	1.708	3.268
n. casi /1.000	8,71	7,27	7,89
86+ anni			
n. casi	352	714	1.066
n. casi /1.000	5,79	5,65	5,69
Tutte le età			
n. casi	9.497	8.110	17.607
n. casi /1.000	4,31	3,49	3,89

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	8.336	8.376	16.712
n. casi /1.000	8,28	8,64	8,46
46-60 anni			
n. casi	29.188	17.698	46.886
n. casi /1.000	56,21	33,43	44,71
61-75 anni			
n. casi	67.276	48.931	116.207
n. casi /1.000	173,80	115,32	143,22
76-85 anni			
n. casi	39.639	40.650	80.289
n. casi /1.000	236,63	181,91	205,35
86+ anni			
n. casi	10.169	18.008	28.177
n. casi /1.000	198,81	168,11	178,03
Tutte le età			
n. casi	154.608	133.663	288.271
n. casi /1.000	72,51	59,31	65,73

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 250
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 2 prescrizioni in date differenti: A10
ESENZIONI	013
ALTRO	
ALGORITMO	(SDO) or (farmaci) or (esenzione) OR (Registro Regionale Diabetici escludendo il tipo 9)



Iperlipidemia



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di iperlipidemia risulta del 108,47/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (112,56/) rispetto a quelle di sesso femminile (104,59).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 76 e gli 85 anni, con una prevalenza pari a 366,87/1.000, in particolare 352,93 per le persone di sesso femminile e 385,46 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari all'8,63/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso maschile (9,06) rispetto a quelle di sesso femminile (8,22).

TREND. Si nota una decrescita dell'incidenza del 7,8% tra il 2017 e il 2018 e un incremento del 9,1% tra il 2018 e il 2019, più marcato per le persone di sesso maschile (10,5%) rispetto a quelle di sesso femminile (7,4%).


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.222	534	1.756
n. casi /1.000	1,16	0,53	0,86
46-60 anni			
n. casi	5.898	4.438	10.336
n. casi /1.000	11,30	8,36	9,81
61-75 anni			
n. casi	8.736	8.884	17.620
n. casi /1.000	22,28	20,81	21,51
76-85 anni			
n. casi	3.542	4.303	7.845
n. casi /1.000	19,76	18,31	18,94
86+ anni			
n. casi	555	941	1.496
n. casi /1.000	9,14	7,44	7,99
Tutte le età			
n. casi	19.953	19.099	39.052
n. casi /1.000	9,06	8,22	8,63

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	6.501	2.985	9.486
n. casi /1.000	6,45	3,08	4,80
46-60 anni			
n. casi	46.096	27.998	74.094
n. casi /1.000	88,78	52,88	70,65
61-75 anni			
n. casi	108.448	99.824	208.272
n. casi /1.000	280,16	235,25	256,68
76-85 anni			
n. casi	64.570	78.868	143.438
n. casi /1.000	385,46	352,93	366,87
86+ anni			
n. casi	14.410	26.025	40.435
n. casi /1.000	281,72	242,95	255,48
Tutte le età			
n. casi	240.025	235.700	475.725
n. casi /1.000	112,56	104,59	108,47

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 2720, 2721, 2722, 2723, 2724
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 4 prescrizioni in date differenti C10AA, C10AB, C10AC, C10AX, C10BA
ESENZIONI	
ALTRO	



Gotta e iperuricemia in trattamento



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di gotta (e iperuricemia in trattamento) risulta del 27,90/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (36,53) rispetto a quelle di sesso femminile (19,73).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella degli over 85 anni, con una prevalenza pari a 116,96/1.000, in particolare 97,29 per le persone di sesso femminile e 158,14 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 3,80/1.000, maggiore nelle persone di sesso maschile (4,69).

TREND. Mentre nel 2018 vi è una decrescita dell'incidenza di circa il 9% rispetto al 2017 sia per le persone di sesso maschile che per quelle di sesso femminile, nel 2019 si registra un incremento rispetto al 2018 all'incirca della stessa entità per entrambi i sessi.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	363	109	473
n. casi /1.000	0,35	0,11	0,23
46-60 anni			
n. casi	1.600	533	2.133
n. casi /1.000	3,06	1,00	2,02
61-75 anni			
n. casi	4.239	2.108	6.346
n. casi /1.000	10,81	4,94	7,75
76-85 anni			
n. casi	3.122	2.628	5.750
n. casi /1.000	17,42	11,18	13,88
86+ anni			
n. casi	1.003	1.507	2.510
n. casi /1.000	16,53	11,91	13,41
Tutte le età			
n. casi	10.327	6.885	17.212
n. casi /1.000	4,69	2,96	3,80

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.752	509	2.261
n. casi /1.000	1,74	0,53	1,14
46-60 anni			
n. casi	9.766	2.664	12.430
n. casi /1.000	18,81	5,03	11,85
61-75 anni			
n. casi	31.607	13.235	44.842
n. casi /1.000	81,65	31,19	55,26
76-85 anni			
n. casi	26.674	17.632	44.306
n. casi /1.000	159,23	78,90	113,32
86+ anni			
n. casi	8.089	10.422	18.511
n. casi /1.000	158,14	97,29	116,96
Tutte le età			
n. casi	77.888	44.462	122.350
n. casi /1.000	36,53	19,73	27,90

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 274
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 4 prescrizioni in date differenti M04AA, M04AC, M04AX
ESENZIONI	
ALTRO	



Disordini psichiatrici



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di disordini psichiatrici (senza comprendere la depressione) risulta del 7,73/1.000, leggermente maggiore per le persone di sesso maschile (8,03) rispetto a quelle di sesso femminile (7,45).

CLASSE DI ETÀ. Risultano più affette le persone con età superiore agli 85 anni (con una prevalenza pari al 23,02/1.000), con maggiore intensità per le persone di sesso femminile (26,11) rispetto a quelle di sesso maschile (16,54).

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari allo 1,02/1.000, all'incirca la stessa nelle persone di sesso femminile e maschile.

TREND. Si nota un trend generale di leggera decrescita dell'incidenza tra il 2017 e il 2019, assumendo comunque sempre valori molto bassi.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	658	381	1.039
n. casi /1.000	0,63	0,38	0,51
46-60 anni			
n. casi	307	284	590
n. casi /1.000	0,59	0,53	0,56
61-75 anni			
n. casi	341	291	632
n. casi /1.000	0,87	0,68	0,77
76-85 anni			
n. casi	514	558	1.072
n. casi /1.000	2,87	2,37	2,59
86+ anni			
n. casi	396	869	1.264
n. casi /1.000	6,52	6,87	6,76
Tutte le età			
n. casi	2.216	2.382	4.598
n. casi /1.000	1,01	1,03	1,02

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	6.040	3.322	9.362
n. casi /1.000	6,00	3,43	4,74
46-60 anni			
n. casi	5.319	4.449	9.768
n. casi /1.000	10,24	8,40	9,31
61-75 anni			
n. casi	3.248	3.580	6.828
n. casi /1.000	8,39	8,44	8,41
76-85 anni			
n. casi	1.672	2.648	4.320
n. casi /1.000	9,98	11,85	11,05
86+ anni			
n. casi	846	2.797	3.643
n. casi /1.000	16,54	26,11	23,02
Tutte le età			
n. casi	17.125	16.796	33.921
n. casi /1.000	8,03	7,45	7,73

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 295, 2960, 2961, 2964, 2965, 2966, 2967, 29680, 29681, 29689, 297, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2988, 2989
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 4 prescrizioni in date differenti N05A (escludendo N05AN01)
ESENZIONI	044
ALTRO	Si sottrae la depressione



Demenza



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza della demenza risulta del 6,99/1.000, maggiore per le persone di sesso femminile (8,94) rispetto a quelle di sesso maschile (4,92).

CLASSE DI ETÀ. Risultano più affette le persone con età superiore agli 86 anni, con una prevalenza pari al 61,86/1.000, in particolare 69,51 per le persone di sesso femminile e 45,85 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 2,18/1.000, maggiore nelle persone di sesso femminile (2,52).

TREND. Si nota un leggero trend di crescita dell'incidenza nei tre anni.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	18	17	35
n. casi /1.000	0,02	0,02	0,02
46-60 anni			
n. casi	88	62	150
n. casi /1.000	0,17	0,12	0,14
61-75 anni			
n. casi	685	763	1.448
n. casi /1.000	1,75	1,79	1,77
76-85 anni			
n. casi	1.902	2.568	4.470
n. casi /1.000	10,62	10,93	10,79
86+ anni			
n. casi	1.292	2.455	3.746
n. casi /1.000	21,28	19,41	20,02
Tutte le età			
n. casi	3.985	5.865	9.850
n. casi /1.000	1,81	2,52	2,18

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	121	108	229
n. casi /1.000	0,12	0,11	0,12
46-60 anni			
n. casi	359	299	658
n. casi /1.000	0,69	0,56	0,63
61-75 anni			
n. casi	2.314	2.752	5.066
n. casi /1.000	5,98	6,49	6,24
76-85 anni			
n. casi	5.356	9.551	14.907
n. casi /1.000	31,97	42,74	38,13
86+ anni			
n. casi	2.345	7.446	9.791
n. casi /1.000	45,85	69,51	61,86
Tutte le età			
n. casi	10.495	20.156	30.651
n. casi /1.000	4,92	8,94	6,99

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 290, 2912, 2940, 2941, 29282, 3310, 3311, 3312, 3317, 3318 (escludendo 33181), 3319, 29421, 3315
FARMACI	Negli ultimi 12 mesi, almeno 2 prescrizioni in date differenti: N06DA02, N06DA03, N06DA04, N06DX01
ESENZIONI	011, 029
ALTRO	



Depressione



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza della depressione risulta dell'81,50/1.000, molto maggiore per le persone di sesso femminile (108,76) rispetto a quelle di sesso maschile (52,69).

CLASSE DI ETÀ. Risultano più affette le persone con età superiore agli 85 anni, con una prevalenza pari a 221,39/1.000, in particolare 254,45 per le persone di sesso femminile e 152,16 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 10,94/1.000, con un valore più alto per le persone di sesso femminile (13,73).

TREND. Si nota un trend generale di decrescita dell'incidenza nei tre anni, marcato soprattutto tra il 2017 e il 2018.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	3.525	5.943	9.468
n. casi /1.000	3,36	5,92	4,61
46-60 anni			
n. casi	3.896	7.775	11.671
n. casi /1.000	7,46	14,64	11,08
61-75 anni			
n. casi	4.553	7.780	12.333
n. casi /1.000	11,61	18,22	15,06
76-85 anni			
n. casi	4.042	6.840	10.882
n. casi /1.000	22,56	29,10	26,27
86+ anni			
n. casi	1.595	3.550	5.145
n. casi /1.000	26,28	28,07	27,49
Tutte le età			
n. casi	17.612	31.888	49.499
n. casi /1.000	7,99	13,73	10,94

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	20.024	32.259	52.283
n. casi /1.000	19,88	33,29	26,45
46-60 anni			
n. casi	29.472	61.129	90.601
n. casi /1.000	56,76	115,45	86,39
61-75 anni			
n. casi	31.831	69.749	101.580
n. casi /1.000	82,23	164,38	125,19
76-85 anni			
n. casi	23.233	54.688	77.921
n. casi /1.000	138,69	244,73	199,30
86+ anni			
n. casi	7.783	27.257	35.040
n. casi /1.000	152,16	254,45	221,39
Tutte le età			
n. casi	112.343	245.082	357.425
n. casi /1.000	52,69	108,76	81,50

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 2962, 2963, 29682, 2969, 3004, 3090, 3091, 311
FARMACI	Negli ultimi 12 mesi, almeno 2 prescrizioni in date differenti: N06A
ESENZIONI	
ALTRO	



Sclerosi multipla



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di sclerosi multipla risulta del 2,21/1.000, maggiore per le persone di sesso femminile (2,91) rispetto a quelle di sesso maschile (1,47).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 46 e i 60 anni, con una prevalenza del 3,82/1.000, in particolare 5,18 per le persone di sesso femminile e 2,44 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari allo 0,12/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso femminile (0,15).

TREND. L'incidenza rimane sostanzialmente stabile nei tre anni, mantenendosi su valori molto bassi.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	98	203	301
n. casi /1.000	0,09	0,20	0,15
46-60 anni			
n. casi	57	108	165
n. casi /1.000	0,11	0,20	0,16
61-75 anni			
n. casi	21	38	59
n. casi /1.000	0,05	0,09	0,07
76-85 anni			
n. casi	3,33	9,33	12,67
n. casi /1.000	0,02	0,04	0,03
86+ anni			
n. casi	1	1	1
n. casi /1.000	0,02	0,01	0,01
Tutte le età			
n. casi	180	359	538
n. casi /1.000	0,08	0,15	0,12

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.166	2.273	3.439
n. casi /1.000	1,16	2,35	1,74
46-60 anni			
n. casi	1.265	2.740	4.005
n. casi /1.000	2,44	5,18	3,82
61-75 anni			
n. casi	605	1.296	1.901
n. casi /1.000	1,56	3,05	2,34
76-85 anni			
n. casi	84	234	318
n. casi /1.000	0,50	1,05	0,81
86+ anni			
n. casi	8	20	28
n. casi /1.000	0,16	0,19	0,18
Tutte le età			
n. casi	3.128	6.563	9.691
n. casi /1.000	1,47	2,91	2,21

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 340
FARMACI	Negli ultimi sei anni, almeno 2 prescrizioni in date differenti: L03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, N07XX09
ESENZIONI	Negli ultimi 6 anni: 046, 340
ALTRO	



Parkinson e parkinsonismi



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di morbo di Parkinson risulta del 7,76/1.000, lievemente maggiore per le persone di sesso femminile (7,88) rispetto a quelle di sesso maschile (7,62).

CLASSE DI ETÀ. Le classi di età che risultano più affette sono quelle tra i 76 e gli 85 anni e degli over 85 anni (con prevalenza pari al 33,83/1.000 e 36,54/1.000 rispettivamente). In entrambi i casi la prevalenza è superiore per le persone di sesso maschile rispetto a quelle di sesso femminile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari all'1,14/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso maschile (1,17).

TREND. Si nota una leggera decrescita dell'incidenza tra il 2017 e il 2018, mentre vi è un lieve incremento tra il 2018 e il 2019.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	150	99	248
n. casi /1.000	0,14	0,10	0,12
46-60 anni			
n. casi	263	233	496
n. casi /1.000	0,50	0,44	0,47
61-75 anni			
n. casi	762	690	1.452
n. casi /1.000	1,94	1,62	1,77
76-85 anni			
n. casi	1.053	1.068	2.121
n. casi /1.000	5,88	4,54	5,12
86+ anni			
n. casi	345	500	845
n. casi /1.000	5,68	3,95	4,51
Tutte le età			
n. casi	2.572	2.576	5.148
n. casi /1.000	1,17	1,11	1,14

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.021	570	1.591
n. casi /1.000	1,01	0,59	0,80
46-60 anni			
n. casi	1.999	1.756	3.755
n. casi /1.000	3,85	3,32	3,58
61-75 anni			
n. casi	4.987	4.673	9.660
n. casi /1.000	12,88	11,01	11,91
76-85 anni			
n. casi	6.196	7.032	13.228
n. casi /1.000	36,99	31,47	33,83
86+ anni			
n. casi	2.053	3.731	5.784
n. casi /1.000	40,14	34,83	36,54
Tutte le età			
n. casi	16.256	17.762	34.018
n. casi /1.000	7,62	7,88	7,76

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 332, 3330, 3331, 3334, 3335
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 4 prescrizioni in date differenti: N04AA, N04AB, N04BA, N04BC, N04BD, N04BX
ESENZIONI	038
ALTRO	



Cardiopatia ischemica



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di cardiopatia ischemica risulta del 26,61/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (37,90) rispetto a quelle di sesso femminile (15,92).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 76 e gli 85 anni, con prevalenza pari a 94,95/1.000, in particolare 59,05 per le persone di sesso femminile e 142,83 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017 e 2018 risulta pari al 4,16/1.000, superiore nelle persone di sesso maschile (5,51).

TREND. Si nota una decrescita di circa il 2% dell'incidenza tra il 2017 e il 2018, sia per le persone di sesso maschile che per quelle di sesso femminile.


Incidenza media 2017-2018

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	281	76	357
n. casi /1.000	0,26	0,07	0,17
46-60 anni			
n. casi	2.269	613	2.882
n. casi /1.000	4,36	1,16	2,74
61-75 anni			
n. casi	4.928	1.858	6.786
n. casi /1.000	12,62	4,37	8,32
76-85 anni			
n. casi	3.330	2.199	5.529
n. casi /1.000	18,61	9,33	13,34
86+ anni			
n. casi	1.372	1.975	3.347
n. casi /1.000	22,98	15,73	18,06
Tutte le età			
n. casi	12.179	6.721	18.899
n. casi /1.000	5,51	2,88	4,16

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.314	427	1.741
n. casi /1.000	1,30	0,44	0,88
46-60 anni			
n. casi	13.760	3.570	17.330
n. casi /1.000	26,50	6,74	16,53
61-75 anni			
n. casi	35.552	11.885	47.437
n. casi /1.000	91,84	28,01	58,46
76-85 anni			
n. casi	23.927	13.196	37.123
n. casi /1.000	142,83	59,05	94,95
86+ anni			
n. casi	6.269	6.806	13.075
n. casi /1.000	122,56	63,54	82,61
Tutte le età			
n. casi	80.822	35.884	116.706
n. casi /1.000	37,90	15,92	26,61

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 410, 411, 412, 413, 414
FARMACI	
ESENZIONI	
ALTRO	Cause di morte per l'incidenza (ICD10): I20, I21, I22, I24, I25



Vasculopatie cerebrali



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di vasculopatie cerebrali risulta del 20,63/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (22,24) rispetto a quelle di sesso femminile (19,10).

CLASSE DI ETÀ. Risultano più affette le persone con età superiore agli 86 anni, con una prevalenza del 108,95/1.000, in particolare 118,69 per le persone di sesso femminile e 104,30 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2018 risulta pari al 4,43/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso femminile (4,52).

TREND. Globalmente e per le persone di sesso maschile si nota una crescita dell'incidenza tra il 2017 e il 2018, mentre diminuisce per le persone di sesso femminile.


Incidenza media 2017-2018

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	406	323	729
n. casi /1.000	0,38	0,32	0,35
46-60 anni			
n. casi	954	583	1.536
n. casi /1.000	1,83	1,10	1,46
61-75 anni			
n. casi	2.710	1.769	4.479
n. casi /1.000	6,94	4,16	5,49
76-85 anni			
n. casi	3.436	3.560	6.996
n. casi /1.000	19,21	15,11	16,88
86+ anni			
n. casi	2.100	4.298	6.398
n. casi /1.000	35,19	34,22	34,54
Tutte le età			
n. casi	9.605	10.532	20.137
n. casi /1.000	4,34	4,52	4,43

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	2.235	1.923	4.158
n. casi /1.000	2,22	1,98	2,10
46-60 anni			
n. casi	5.611	4.275	9.886
n. casi /1.000	10,81	8,07	9,43
61-75 anni			
n. casi	16.901	10.544	27.445
n. casi /1.000	43,66	24,85	33,82
76-85 anni			
n. casi	16.609	15.124	31.733
n. casi /1.000	99,15	67,68	81,16
86+ anni			
n. casi	6.071	11.173	17.244
n. casi /1.000	118,69	104,30	108,95
Tutte le età			
n. casi	47.427	43.039	90.466
n. casi /1.000	22,24	19,10	20,63

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438
FARMACI	
ESENZIONI	002 dal 2017: 0B02
ALTRO	Cause di morte per l'incidenza (ICD10): I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68, I69



Scompenso cardiaco



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di scompenso cardiaco risulta del 18,80/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (20,99) rispetto a quelle di sesso femminile (16,72).

CLASSE DI ETÀ. Risultano più affette le persone con età superiore agli 85 anni, con una prevalenza pari a 113,91/1.000, con maggiore intensità per le persone di sesso maschile (126,41) rispetto a quelle di sesso femminile (107,94).

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 3,79/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso maschile (3,99).

TREND. Si nota un leggero trend di crescita dell'incidenza nei tre anni (globalmente 3,2% tra il 2017 e il 2018 e 0,5% tra il 2018 e il 2019) sia per le persone di sesso maschile sia per quelle di sesso femminile.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	186	89	275
n. casi /1.000	0,18	0,09	0,13
46-60 anni			
n. casi	863	328	1.191
n. casi /1.000	1,65	0,62	1,13
61-75 anni			
n. casi	2.513	1.463	3.976
n. casi /1.000	6,41	3,43	4,85
76-85 anni			
n. casi	3.220	3.130	6.350
n. casi /1.000	17,97	13,32	15,33
86+ anni			
n. casi	2.003	3.372	5.376
n. casi /1.000	33,00	26,67	28,72
Tutte le età			
n. casi	8.786	8.383	17.169
n. casi /1.000	3,99	3,61	3,79

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.067	573	1.640
n. casi /1.000	1,06	0,59	0,83
46-60 anni			
n. casi	5.371	2.034	7.405
n. casi /1.000	10,34	3,84	7,06
61-75 anni			
n. casi	16.040	8.667	24.707
n. casi /1.000	41,44	20,43	30,45
76-85 anni			
n. casi	15.822	14.833	30.655
n. casi /1.000	94,45	66,38	78,40
86+ anni			
n. casi	6.466	11.563	18.029
n. casi /1.000	126,41	107,94	113,91
Tutte le età			
n. casi	44.766	37.670	82.436
n. casi /1.000	20,99	16,72	18,80

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 39891, 402, 40401, 40403, 40411, 40413, 40491, 40493, 4254, 4255, 4259, 428
FARMACI	
ESENZIONI	021
ALTRO	



Asma



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di asma per le persone di età inferiore ai 45 anni risulta del 72,98/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (74,97) rispetto a quelle di sesso femminile (70,92).

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 9,40/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso femminile (9,55) rispetto a quelle di sesso maschile (9,25).

TREND. Si nota un trend di decrescita dell'incidenza nei tre anni.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	9.701	9.589	19.290
n. casi /1.000	9,25	9,55	9,40
46-60 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
61-75 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
76-85 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
86+ anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
< 46 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	75.523	68.726	144.249
n. casi /1.000	74,97	70,92	72,98
46-60 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
61-75 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
76-85 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
86+ anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
< 46 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 493
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 2 prescrizioni in date differenti: R03AK06, R03AK07, R03BA, R03BC, R03DA, R03DC
ESENZIONI	007
ALTRO	Età ≤45



Broncopneumopatia cronica ostruttiva



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di BPCO per le persone di età superiore ai 45 anni risulta del 39,19/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (42,29) rispetto a quelle di sesso femminile (36,47).

CLASSE DI ETÀ. Risultano più affette le persone con età superiore agli 85 anni, con prevalenza pari a 87,81/1.000, in particolare 75,63 per le persone di sesso femminile e 113,31 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 5,60/1.000, leggermente maggiore nelle persone di sesso maschile (5,92).

TREND. Globalmente si nota una decrescita dell'incidenza tra il 2017 e il 2018 e un lieve incremento tra il 2018 e il 2019.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
46-60 anni			
n. casi	1.165	1.238	2.403
n. casi /1.000	2,23	2,33	2,28
61-75 anni			
n. casi	2.639	2.401	5.040
n. casi /1.000	6,73	5,62	6,15
76-85 anni			
n. casi	2.110	1.996	4.105
n. casi /1.000	11,77	8,49	9,91
86+ anni			
n. casi	916	1.384	2.300
n. casi /1.000	15,09	10,95	12,29
> 45 anni			
n. casi	6.830	7.019	13.848
n. casi /1.000	5,92	5,32	5,60

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi			
n. casi /1.000			
46-60 anni			
n. casi	7.497	7.699	15.196
n. casi /1.000	14,44	14,54	14,49
61-75 anni			
n. casi	17.833	16.248	34.081
n. casi /1.000	46,07	38,29	42,00
76-85 anni			
n. casi	16.452	14.792	31.244
n. casi /1.000	98,21	66,19	79,91
86+ anni			
n. casi	5.796	8.102	13.898
n. casi /1.000	113,31	75,63	87,81
> 45 anni			
n. casi	47.578	46.841	94.419
n. casi /1.000	42,29	36,47	39,19

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Diagnosi principale (negli ultimi 6 anni): 490, 491, 492, 494, 496 Oppure Diagnosi secondarie come sopra + diagnosi principale per cause correlate (negli ultimi 6 anni): 51881, 51882, 51883, 51884, 7860, 7862, 7864
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 4 prescrizioni in mesi differenti: R03A, R03BB01, R03BB02, R03BB04, R03CC02, R03CC03, R03CC04, R03CK, R03DA01, R03DA04, R03DA05, R03DA08, R03DA11, R03DA49
ESENZIONI	024 , dal 2017: 057
ALTRO	Si sottraggono le esenzioni per asma (007). Età >45



Morbo di Crohn e coliti ulcerative



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza del morbo di Crohn risulta del 3,84/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (4,28) rispetto a quelle di sesso femminile (3,42).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 61 e i 75 anni, con una prevalenza pari al 5,52/1.000, in particolare 4,33 per le persone di sesso femminile e 6,82 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari allo 0,24/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso maschile (0,26 rispetto a 0,22).

TREND. Il trend dell'incidenza è sostanzialmente stabile nei tre anni considerati.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	249	208	458
n. casi /1.000	0,24	0,21	0,22
46-60 anni			
n. casi	131	111	241
n. casi /1.000	0,25	0,21	0,23
61-75 anni			
n. casi	128	104	232
n. casi /1.000	0,33	0,24	0,28
76-85 anni			
n. casi	60	69	129
n. casi /1.000	0,33	0,29	0,31
86+ anni			
n. casi	14	30	44
n. casi /1.000	0,23	0,24	0,23
Tutte le età			
n. casi	582	522	1.104
n. casi /1.000	0,26	0,22	0,24

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	2.608	2.404	5.012
n. casi /1.000	2,59	2,48	2,54
46-60 anni			
n. casi	2.789	2.343	5.132
n. casi /1.000	5,37	4,43	4,89
61-75 anni			
n. casi	2.641	1.838	4.479
n. casi /1.000	6,82	4,33	5,52
76-85 anni			
n. casi	901	792	1.693
n. casi /1.000	5,38	3,54	4,33
86+ anni			
n. casi	182	323	505
n. casi /1.000	3,56	3,02	3,19
Tutte le età			
n. casi	9.121	7.700	16.821
n. casi /1.000	4,28	3,42	3,84

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 10 anni): 555, 5560, 5562, 5563, 5565, 5566, 5569
FARMACI	
ESENZIONI	009
ALTRO	



Epatite cronica



PREVALENZA. Nel 2019 di epatite cronica risulta dell'8,72/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (10,11) rispetto a quelle di sesso femminile (7,39).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 46 e i 60 anni, con una prevalenza pari al 14,07/1.000, in particolare 9.59 per le persone di sesso femminile e 18,64 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari allo 0,56/1.000, leggermente maggiore per le persone di sesso maschile (0,65).

TREND. L'incidenza si mantiene sostanzialmente stabile nei tre anni, con un lieve incremento tra il 2017 e il 2018.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	386	304	690
n. casi /1.000	0,37	0,30	0,34
46-60 anni			
n. casi	582	371	953
n. casi /1.000	1,12	0,70	0,91
61-75 anni			
n. casi	302	254	555
n. casi /1.000	0,77	0,59	0,68
76-85 anni			
n. casi	123	132	256
n. casi /1.000	0,69	0,56	0,62
86+ anni			
n. casi	29	51	81
n. casi /1.000	0,48	0,41	0,43
Tutte le età			
n. casi	1.423	1.112	2.535
n. casi /1.000	0,65	0,48	0,56

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	3.844	2.945	6.789
n. casi /1.000	3,82	3,04	3,43
46-60 anni			
n. casi	9.680	5.079	14.759
n. casi /1.000	18,64	9,59	14,07
61-75 anni			
n. casi	5.611	5.066	10.677
n. casi /1.000	14,50	11,94	13,16
76-85 anni			
n. casi	2.102	2.968	5.070
n. casi /1.000	12,55	13,28	12,97
86+ anni			
n. casi	331	597	928
n. casi /1.000	6,47	5,57	5,86
Tutte le età			
n. casi	21.568	16.655	38.223
n. casi /1.000	10,11	7,39	8,72

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 07022, 07023, 07032, 07033, 07044, 07054, 5714, 5718, 5719
FARMACI	
ESENZIONI	016
ALTRO	



Cirrosi epatica



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di cirrosi risulta del 3,87/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (4,55) rispetto a quelle di sesso femminile (3,23).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 61 e i 75 anni, con una prevalenza pari al 7,49/1.000, in particolare 5,83 per le persone di sesso femminile e 9,31 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari allo 0,60/1.000, leggermente maggiore per le persone di sesso maschile (0,74).

TREND. L'incidenza presenta una lieve diminuzione nel corso dei tre anni.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	222	177	399
n. casi /1.000	0,21	0,18	0,19
46-60 anni			
n. casi	475	265	740
n. casi /1.000	0,91	0,50	0,70
61-75 anni			
n. casi	561	308	869
n. casi /1.000	1,43	0,72	1,06
76-85 anni			
n. casi	301	243	544
n. casi /1.000	1,68	1,03	1,31
86+ anni			
n. casi	73	109	182
n. casi /1.000	1,20	0,86	0,97
Tutte le età			
n. casi	1.632	1.102	2.734
n. casi /1.000	0,74	0,47	0,60

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	1.416	1.132	2.548
n. casi /1.000	1,41	1,17	1,29
46-60 anni			
n. casi	3.175	1.936	5.111
n. casi /1.000	6,11	3,66	4,87
61-75 anni			
n. casi	3.602	2.474	6.076
n. casi /1.000	9,31	5,83	7,49
76-85 anni			
n. casi	1.289	1.320	2.609
n. casi /1.000	7,69	5,91	6,67
86+ anni			
n. casi	218	414	632
n. casi /1.000	4,26	3,86	3,99
Tutte le età			
n. casi	9.700	7.276	16.976
n. casi /1.000	4,55	3,23	3,87

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 5712, 5715, 5716, 5718, 5719, 5722, 5723, 5724, 4560, 4561, 4562, 45620, 45621
FARMACI	Negli ultimi due anni, almeno 2 prescrizioni in date differenti: B02BA, B05AA
ESENZIONI	008
ALTRO	



Patologie renali croniche



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di patologie renali croniche risulta del 17,87/1.000, maggiore per le persone di sesso maschile (21,33) rispetto a quelle di sesso femminile (14,59).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella delle persone con età superiore agli 85 anni, con una prevalenza del 68,50/1.000, in particolare 53,95 per le persone di sesso femminile e 98,96 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari al 3,18/1.000, superiore per le persone di sesso maschile (3,73).

TREND. Per entrambi i sessi si registra un incremento dell'incidenza tra il 2017 e il 2018, seguito da un decremento nel 2019.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	655	696	1.350
n. casi /1.000	0,62	0,69	0,66
46-60 anni			
n. casi	895	601	1.496
n. casi /1.000	1,71	1,13	1,42
61-75 anni			
n. casi	2.584	1.410	3.994
n. casi /1.000	6,59	3,30	4,88
76-85 anni			
n. casi	2.807	1.963	4.770
n. casi /1.000	15,66	8,35	11,52
86+ anni			
n. casi	1.280	1.506	2.785
n. casi /1.000	21,08	11,91	14,88
Tutte le età			
n. casi	8.220	6.176	14.396
n. casi /1.000	3,73	2,66	3,18

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	4.186	4.430	8.616
n. casi /1.000	4,16	4,57	4,36
46-60 anni			
n. casi	6.168	4.469	10.637
n. casi /1.000	11,88	8,44	10,14
61-75 anni			
n. casi	15.340	8.492	23.832
n. casi /1.000	39,63	20,01	29,37
76-85 anni			
n. casi	14.720	9.711	24.431
n. casi /1.000	87,87	43,46	62,49
86+ anni			
n. casi	5.062	5.779	10.841
n. casi /1.000	98,96	53,95	68,50
Tutte le età			
n. casi	45.476	32.881	78.357
n. casi /1.000	21,33	14,59	17,87

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 2504, 403, 404, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 5900, 7531, V420, V56 Procedure (negli ultimi 6 anni): 3995, 5498, 556, 3927, 5493, 3942, 3943, 3895, 5523
FARMACI	Nell'anno, almeno 1 prescrizione: B03XA01, B03XA02, B03XA03, V03AE01, V03AE02, V03AE03, V03AE05
ESENZIONI	023, 061
ALTRO	Visita nefrologica: branca 29, prestazioni 89.7, 89.01 Misurazione albuminuria: prestazione 90.33.4
ALGORITMO	(SDO) OR (esenzione) OR (2 visite) OR (visita + farmaco) OR (visita + misurazione albuminuria)



Artrite reumatoide



PREVALENZA. Nel 2019 la prevalenza di artrite reumatoide risulta del 5,74/1.000, maggiore per le persone di sesso femminile (8,09) rispetto a quelle di sesso maschile (3,26).

CLASSE DI ETÀ. La classe di età che risulta più affetta è quella tra i 76 e gli 85 anni, con una prevalenza pari al 13,68/1.000, in particolare 17,51 per le persone di sesso femminile e 8,57 per le persone di sesso maschile.

INCIDENZA. Negli anni 2017-2019 risulta pari allo 0,52/1.000, leggermente superiore nelle persone di sesso femminile (0,69).

TREND. Si nota un trend di crescita dell'incidenza nei tre anni sia per le persone di sesso maschile che per quelle di sesso femminile.


Incidenza media 2017-2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	104	265	369
n. casi /1.000	0,10	0,26	0,18
46-60 anni			
n. casi	225	477	702
n. casi /1.000	0,43	0,90	0,67
61-75 anni			
n. casi	279	515	794
n. casi /1.000	0,71	1,21	0,97
76-85 anni			
n. casi	154	275	429
n. casi /1.000	0,86	1,17	1,03
86+ anni			
n. casi	18	65	82
n. casi /1.000	0,29	0,51	0,44
Tutte le età			
n. casi	780	1.596	2.376
n. casi /1.000	0,35	0,69	0,52

Prevalenza 2019

Classe di età	Maschi	Femmine	Tutti
0-45 anni			
n. casi	787	2.225	3.012
n. casi /1.000	0,78	2,30	1,52
46-60 anni			
n. casi	1.679	4.401	6.080
n. casi /1.000	3,23	8,31	5,80
61-75 anni			
n. casi	2.781	6.720	9.501
n. casi /1.000	7,18	15,84	11,71
76-85 anni			
n. casi	1.436	3.914	5.350
n. casi /1.000	8,57	17,51	13,68
86+ anni			
n. casi	266	976	1.242
n. casi /1.000	5,20	9,11	7,85
Tutte le età			
n. casi	6.949	18.236	25.185
n. casi /1.000	3,26	8,09	5,74

Incidenza



Algoritmo di estrazione

SDO	Qualunque diagnosi (negli ultimi 6 anni): 7140
FARMACO + VISITA	Nell'anno, una delle seguenti combinazioni: 2 mtx (L01BA01), 2 leflunomide (L04AA13), 2 sulfasalazina (A07EC01), mtx + leflunomide, mtx + sulfasalazina, leflunomide + sulfasalazina, mtx/leflunomide/sulfasalazina + steroide (H02AB07 , H02AB04), mtx/leflunomide/sulfasalazina + biologico (L01XC02 , L04AA24 , L04AB01 , L04AB02 , L04AB04 , L04AB05 , L04AB06 , L04AC03 , L04AC07 , L04AC14 , L04AA37 , L04AA29 , L04AX01 , L04AD01)
ESENZIONI	006: Artrite reumatoide
ALTRO	Visita reumatologica: branca 71 , procedure 89.7 , 89.01 , 89.03
ALGORITMO	(SDO) OR (visita + farmaco) OR (esenzione)