

COSOMMINISTRAZIONI

VACCINI	INFLUENZA Inattivato/ Alto dosaggio	INFLUENZA adiuvato	PNEUMOCOCCO 20-VALENTE	PNEUMOCOCCO 23-VALENTE	ZOSTER VIVO ATTENUATO	ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO	COVID 19
INFLUENZA Inattivato/Alto dosaggio			SI	SI	SI	SI	SI
INFLUENZA adiuvato			SI	SI	SI	NO*	SI
PNEUMOCOCCO 20-VALENTE	SI	SI		NO	SI	SI	SI
PNEUMOCOCCO 23-VALENTE	SI	SI	NO		SI	SI	SI
ZOSTER VIVO ATTENUATO	SI	SI	SI	SI			SI
ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO	SI	NO*	SI	SI			SI
COVID 19	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

- SE I VACCINI INATTIVATI PER CUI LA COSOMMINISTRAZIONE E' POSSIBILE (IN QUANTO NON CONTROINDICATA IN SCHEDA TECNICA) NON VENGONO SOMMINISTRATI CONTEMPORANEAMENTE LA VACCINAZIONE SUCCESSIVA SI PUO' EFFETTUARE IN QUALSIASI MOMENTO.
- SE 2 VACCINI VIVI NON VENGONO COSOMMINISTRATI, DEVONO ESSERE EFFETTUATI AD UN INTERVALLO DI ALMENO 4 SETTIMANE L'UNO DALL'ALTRO.
- *IL VACCINO ANTINFLUENZALE ADIUVATO E IL VACCINO ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO DEVONO ESSERE SOMMINISTRATI CON UN INTERVALLO DI ALMENO 15 GIORNI.