

OGGETTO: *Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di oppioidi sintetici- Monitoraggio prescrizioni ed erogazioni SSN*

A seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte di monitoraggio delle prescrizioni ed erogazioni a carico del SSN di medicinali a base di oppioidi sintetici, in attuazione del "*Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici*", si comunica che si rende necessario potenziare tale attività di monitoraggio e di appropriatezza prescrittiva.

A tal fine si ricorda che:

- i farmaci a base di fentanil per gestire il dolore episodico intenso (DEI) NON possono essere utilizzati come terapia di base per controllare il dolore persistente
- i farmaci a base di fentanil per gestire il DEI devono essere utilizzati solo in pazienti oncologici
- le ricette SSN con esenzione "TDL" (terapia del dolore) possono coprire ciascuna un massimo di 30 giorni di terapia
- i pazienti affetti da malattia rara (codice esenzione R...) possono giovare della distribuzione diretta (obbligatoria per utilizzi fuori indicazione).

Si riporta di seguito una tabella con indicazioni e posologia riportate in scheda tecnica:

Medicinale	Indicazioni rimborsate dal SSN	Posologia
Fentanil per DEI (cpr orosolubili, sublinguali, spray nasale)	Gestione del DEI nei pazienti adulti oncologici già in terapia di mantenimento con un oppioide per il dolore cronico da cancro	fino a 4 volte/die (può essere necessario rivedere la dose del farmaco oppioide di base se il paziente presenta più di 4 episodi di DEI al giorno)
Fentanil cerotti	Gestione del dolore cronico grave che richiede la somministrazione continua a lungo termine di oppioidi	sostituire ogni 3 giorni
Buprenorfina cerotti (Durlevatec®, Transtec®)	Dolore oncologico di intensità da moderata a severa dolore severo che non risponde agli analgesici non oppioidi	può essere portato fino a 4 giorni o cambiato 2 volte/settimana
Buprenorfina cerotti (Busette®, Septrapat®)	Dolore non maligno. Intensità moderata (non indicato nel trattamento del dolore acuto)	Ogni 7 giorni
Ossicodone/Naloxone	Dolore severo che non risponde agli analgesici non oppioidi	Ogni 12 ore
Ossicodone	Dolore severo che non risponde agli analgesici non oppioidi	Ogni 12 ore