	Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  <b>Paziente affetto da Disfagia</b>	Codice: ALL06 PSDTA SGQ 07
		Data: 16/12/2025
		Revisione: 0
		Pagina 1 di 2

## MODULO DI SCREENING INFERMIERISTICO DELLA DISFAGIA PER REPARTI DI RICOVERO OSPEDALIERO

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Nata/o il \_\_\_\_\_

Reparto e letto: \_\_\_\_\_ Data del test: \_\_\_\_\_

### STEP 1: Osservazione iniziale - Valutazione dei prerequisiti

Segni osservati	Presente (✓)	Assente (✓)	Se uno o più prerequisiti sono assenti, sospendere la valutazione e ripeterla dopo 24h. Valutare possibile richiesta di visita Dietologica
Vigilanza e collaborazione (15 minuti)			
Stabilità respiratoria			
Stabilità posturale			

### STEP 2: Stato del cavo orale orale

Segni osservati	Presente (✓)	Assente (✓)	
Cavo orale deterso			Provvedere alla detersione  Valutare possibile richiesta di valutazione logopedica
Cavo orale esplorabile			
Detersione spontanea delle secrezioni orali			


**NB:** sospendere l'esame e richiedere Valutazione Logopedica se si rilevano le seguenti condizioni:

- Voce gorgogliante-umida
- Tosse volontaria non efficace-assente

### STEP 3a: Test del bolo d'acqua (WST) (utilizzare cucchiaino da 5 ml di acqua naturale)

Se non ci sono segni di sospetta disfagia, ripetere fino a 3 cucchiaini.

Segni osservati (segnare se presenti)	1° bolo	2° bolo	3° bolo
Tosse immediata			
Difficoltà a deglutire			
Voce gorgogliante dopo la deglutizione			
Respiro affannoso, alterato o variazione del colorito del volto (sottolineare il segno presente)			
Tosse tardiva (entro 3 minuti dalla somministrazione)			

	Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  <b>Paziente affetto da Disfagia</b>	Codice: ALL06 PSDTA SGQ 07
		Data: 16/12/2025
		Revisione: 0
		Pagina 2 di 2

**STEP 3b: Test del bicchiere d'acqua (50 ml di acqua naturale)**

Segni osservati (segnare se presenti)	
Tosse immediata	
Difficoltà a deglutire	
Voce gorgogliante dopo la deglutizione	
Respiro affannoso, alterato o variazione del colorito del volto (sottolineare il segno presente)	
Tosse tardiva (entro 3 minuti dalla somministrazione)	

☒ **Esito del test:** Negativo ➡ procedere con step 3c

Positivo (uno o più segni presenti) = **sospetta Disfagia orofaringea**  
➡ **Non somministrare liquidi per bocca, ripetere Screening dopo 24/48 ore**

**STEP 3c: prova di deglutizione con Acquagel IDDSI 4 - Semisolido**

Segni osservati	Presente (✓)	Assente(✓)
Tosse immediata		
Voce gorgogliante		
Necessità di deglutire più volte per singolo bolo		
Importante rallentamento		
Tosse tardiva (entro 3 minuti)		

☒ **Esito del test**

**WST Positivo + Test Acquagel Negativo** ➡ Richiedere **Valutazione Logopedica** per Disfagia orofaringea

**WST Negativo + Test Acquagel Positivo** ➡ Escludere Disfagia ostruttiva o Esofagea ➡ Richiedere **Valutazione Logopedica** per Disfagia orofaringea

**WST Negativo + Test Acquagel Negativo** ➡ Procedere con STEP 3d

**STEP 3d: prova di deglutizione con solido (tenero-spezziato IDDSI 6), ad esempio biscotto ammorbidito**

Segni osservati	Presente(✓)	Assente(✓)
Tosse immediata		
Voce gorgogliante		
Necessità di deglutire più volte per singolo bolo		
Importante rallentamento		
Residui post-deglutitori all'interno del cavo orale		
Tosse tardiva (entro 3 minuti)		

☒ **Esito del test:** Negativo = non segni clinici indiretti di Disfagia

Step 3d Positivo: sospetta Disfagia Gastroesofagea ➡ **Richiedere EGDS**

Modalità di alimentazione attualmente in corso: \_\_\_\_\_

Firma dell'infermiere e/o del medico esecutore \_\_\_\_\_